

## 29. Kursusgang: Differentialligninger 3

Vi har hidtil kun betragtet differentialligninger med konstante koefficienter. Vi vil nu betragte mere generelle differentialligninger.

En homogen lineær førsteordens differentialligning med variable koefficienter er på formen

$$f'(x) + a(x)f(x) = 0.$$

Homogen betyder at højresiden er lig 0. Førsteordens betyder, at der kun indgår en første afledede af  $f$ . Variable koefficienter betyder, at funktionen  $a$  kan variere, når  $x$  varierer (i modsætning til konstante koefficienter hvor  $a(x) = k$ ).

En sådan ligning har den fuldstændige løsning

$$f(x) = ce^{-A(x)}, \quad (1)$$

hvor  $A(x)$  er en vilkårlig stamfunktion til  $a$  (ofte valgt med konstant lig 0).

### Eksempler:

1. Løs begyndelsesværdiproblemet  $f'(x) + \cos(x) \cdot f(x) = 0$  med  $f(0) = \frac{1}{2}$ :

Vi ser at  $a(x) = \cos x$ . Derudover har vi fra (1) at den fuldstændige løsning er på formen

$$f(x) = ce^{-A(x)}.$$

Vi bestemmer først  $A(x)$ , ved at integrere  $a(x) = \cos(x)$

$$A(x) = \int a(x) dx = \int \cos(x) dx = \sin(x) + k,$$

hvor vi vælger  $k = 0$ . Dermed har vi, at  $f(x) = ce^{-\sin x}$ . Vi bestemmer nu  $c$  ved at benytte vores begyndelsesbetingelse

$$\frac{1}{2} = f(0) = ce^{-\sin 0} = ce^0 = c.$$

Det giver, at løsningen til vores begyndelsesværdiproblem er  $f(x) = \frac{1}{2}e^{-\sin x}$ .

2. Løs begyndelsesværdiproblemet  $f'(x) + e^x f(x) = 0$  med  $f(0) = e$ :

Vi ser, at  $a(x) = e^x$ . Derudover har vi igen, at den fuldstændige løsning er på formen

$$f(x) = ce^{-A(x)}.$$

Vi bestemmer først  $A(x)$ , ved at integrere  $a(x) = e^x$

$$A(x) = \int a(x) dx = \int e^x dx = e^x + k,$$

hvor vi vælger  $k = 0$ . Dermed har vi, at  $f(x) = ce^{-e^x}$ . Vi bestemmer nu  $c$  ved at benytte vores begyndelsesbetingelse

$$e = f(0) = ce^{-e^0} = ce^{-1} \Leftrightarrow c = e^2$$

Det giver at, løsningen til vores begyndelsesværdiproblem er  $f(x) = e^2 e^{-e^x}$ .